NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

Профессионализм и ответственность в каждом решении

ФЛОРОКС OR

Флорфеникол 10%
Раствор для перорального применения

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ФЛОРФЕНИКОЛА С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПТИЦ И СВИНЕЙ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

Флорокс OR

Эффективность в чистом виде





ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не забивает поилки[1]
- Начинает действовать через 10 минут
- Высокоэффективен при сальмонеллезе, колибактериозе, пастереллезе птиц и при плевропневмонии свиней[2]

ОПИСАНИЕ

Антибактериальный раствор на основе флорфеникола с высокой эффективностью в лечении респираторных и желудочно-кишечных заболеваний птиц и свиней.

СОСТАВ

1 мл ФЛОРОКС OR = 100 мг флорфеникол

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе в отношении Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Proteus spp., Enterobacter spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus, Klebsiella pneumoniae, Ornithobacterium rhinotracheale, Micrococcus spp., Mycoplasma spp., Shigella spp., Moraxella spp. Флорфеникол активен в отношении бактерий, которые производят ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорамфениколу.

Флорфеникол, входящий в состав препарата, является производным тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа заменена атомом фтора. Обладает бактериостатическим действием, связываясь в протоплазме бактериальной клетки с рибосомальной субъединицей 70S, блокирует фермент пептидилтрансферазу, что приводит к торможению синтеза белка у чувствительных микроорганизмов на уровне рибосом.

После перорального введения флорфеникол хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает в большинство органов и тканей. Биодоступность флорфеникола после перорального введения составляет у свиней 88%, у птиц – 55%. Максимальная концентрация антибиотика в сыворотке крови достигается через 1 час и поддерживается в организме на терапевтическом уровне в течение 24 часов.

[1]Выпойка препарата без предварительного приготовления маточного раствора (концентрат) через дозирующее устройство. Добавлять препарат в воду необходимо при перемешивании.

[2]Исследования терапевтической эффективности препарата Флорокс OR проводили в ООО МНИЦ «ОЗОС» на поросятах, цыплятах и молодняке различных возрастных категорий, 2017 г

ПОКАЗАНИЯ

- При заболеваниях органов дыхания бактериальной этиологии, в т.ч. плевропневмонии, вызванной Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis
- При атрофическом рините, вызванном Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica
- При микоплазменных инфекциях, вызванных M. hyopneumoniae, M. hyorhinis
- При других заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу

- При пастереллезе, стафилококкозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, гемофилезе, болезнях органов дыхания, вызванных в т.ч. Ornithobacterium rhinotracheale
- Для лечения вторичных бактериальных инфекций при вирусных заболеваниях, в т.ч. колибактериоза
- При других инфекционных болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перорально в течение 7 дней
5 мл препарата /100 кг массы животного
или 5 мг флорфеникола/1 кг массы животного

Перорально в течение 3 дней, при сальмонеллезе - 5 дней
0,2 мл препарата/1 кг массы птицы или
20 мг флорфеникола/1 кг массы птицы

- цыплятам в возрасте до 4-х недель – 100 мл препарата/100 л воды (1 мл на 1 л)
- другим возрастным категориям птицы – 200 мл препарата/100 л воды (2 мл на 1 л)

РЕКОМЕНДУЕМ

Не применять Флорокс OR в дозирующих устройствах систем поения.

Для задачи препарата предварительно необходимо приготовить маточный раствор.
Флорокс OR применять в маточном растворе и системе водопоения в соотношениях 1:50 и выше. Применение других разведений приводит к выпадению действующего вещества в осадок.

ПРИМЕР РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ЗАДАЧИ ПРЕПАРАТА ПТИЦЕ:

Концентрация маточного раствора Флорокс OR	Время выпаивания, час	Процент на дозирующем устройстве для цыплят в возрасте до 4-х недель (исходя из дозы 1 мл препарата на 1 л воды), %	Процент на дозирующем устройстве для других возрастных категорий птицы (исходя из дозы 2 мл препарата на 1 л воды), %
Разведение 1:1 (1 часть препарата 1 часть воды)	24	0,2	0,4
	12	0,4	0,8
Разведение 1:50 (1 часть препарата 50 частей воды)	24	5	10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

Профессионализм и ответственность в каждом решении

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛОРОКС OR В ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ

Флорокс OR имеет высокую антибактериальную активность в отношении полевых штаммов микроорганизмов Salmonella spp., Pasteurella multocida и Escherichia coli

Сальмонеллез	Колибактериоз	Пастереллез



Флорокс OR Импортный флорфеникол 10%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФЛОРОКС OR ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СВИНЕЙ

Флорокс OR высокоэффективен при плевропневмонии, вызванной Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, при атрофическом рините, вызванном Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica

Плевропневмония поросят	Атрофический ринит поросят



Флорокс OR Импортный флорфеникол 10%

Максимальный терапевтический эффект достигается при круглосуточной задаче препарата. В случае, когда это невозможно, суточную дозу делят на 2 части и задают с интервалом 12 часов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

6 суток 15 суток

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность к одному из компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Не допускается применение препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку менее чем за 14 суток до начала яйцекладки в связи с накоплением флорфеникола в яйцах.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Переходите в раздел сайта НИТА-ФАРМ:
В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ

УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ
Болезни указаны в соответствии с системами органов, где протекает патологический процесс. Алфавитный указатель поможет Вам быстро найти ответы на интересующие вопросы

РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЗАДАЧ
Схемы лечения от НИТА-ФАРМ

WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/

WWW.NITA-FARM.RU

Бесплатные звонки по России 8 800 700 02 20
Звонки из-за границы +7 (8452) 338 600
Офис в Москве ТД «НИТА-ФАРМ» +7 495 136 62 55