СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____

_____

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Эймицид®

(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-5.23-4978№ПВР-3-5.23/03802

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

-торговое наименование:Эймицид®(Eimicid);

- международное непатентованное наименование: салиномицин.

2. Лекарственная форма: гранулы для орального применения.

Эймицид®в 1 г в качестве действующего вещества содержит 120 мг салиномицина, а также вспомогательные вещества- повидон (поливинилпирролидон) и мел.

3. По внешнему видуЭймицид®представляет собой гранулыот серого до серо-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 3 месяца. Запрещается применять Эймицид®по истечении срока годности.

4.Эймицид®выпускают расфасованным по 500 г, 1 кг и 5 кг в пакеты из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги; по 5 кг, 10 кг, 20 кг и 25 кг в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым внутренним слоем. Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Эймицид® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания, кормов, в защищенном от влаги и отпрямых солнечных лучей месте при температуре от 2ºС до 25ºС и относительной влажности не более 75%.

6.Эймицид®следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.Эймицид®отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9.Эймицид®относится к антикокцидийным лекарственным препаратам

группы полиэфирных ионофоров.

10.Салиномицин, входящий в состав лекарственного препарата,представляет собой продукт ферментации гриба Streptomycesalbus, обладает широким спектром антикокцидийного действия, активен в отношении: E. necatrix, E. mitis, E. acervulina,E. tenella, E. brunetti, E. maxima, E. mivati, E. praecox и других видов кокцидий, паразитирующих у птиц.

Механизм действия салиномицинасвязан с нарушением переноса катионов натрия и калия у неполовозрелых форм кокцидий, что приводит к их гибели на стадии шизогонии.

После перорального применениянрепарата Эймицид® практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает антикокцидийное действие в слизистой оболочке и подслизистомслое кишечника.Выводится из организма преимущественно в неизмененномвиде с пометом.

Эймицид® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11.Эймицид® назначают цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур с целью профилактики кокцидиоза.

12.Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность птицы к салиномицину.Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки, ввиду его накопления в яйцах.

13.При работе с препаратом Эймицид® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы с препаратом руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо немедленно промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат не предназначен для применения млекопитающим.

15. Эймицид® применяют птицев смеси с кормом в дозе 500 г на 1 тонну корма (в пересчете на действующее вещество – 60 мг салиномицина на 1 кг корма, что соответствует 6 мг салиномицина на 1 кг массы тела птицы):

– цыплятам-бройлерам -с первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 суток до убоя;

– ремонтному молодняку кур - с первого дня жизни, исключая из рациона за 14 суток до начала яйцекладки.

Для обеспечения равномерного распределения лекарственного препарата в корме используют двухступенчатое смешивание: рассчитанное количествопрепарата Эймицид® смешивают с небольшим количеством (до 10% от суточного потребления) комбикорма, а затем при тщательном перемешивании вносят в оставшийся объём комбикорма.

Эймицид® устойчив к кратковременному воздействию повышенной температуры и может использоваться при изготовлении гранулированного комбикорма при стандартных режимах гранулирования. В составе комбикорма лекарственный препарат стабилен в течение 3-х месяцев.

16. При использовании лекарственного препарата согласно инструкции, побочных явлений и осложнений не установлено.

17. При передозировке препаратаЭймицид® у птицыможет наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. Не допускается применение лекарственного препарата одновременно с другими антикокцидийными средствами, а также с сульфаниламидами, эритромицином, олеандомицином. Запрещается применять Эймицид® совместно с тиамулином, а также за 7 суток до начала и 7 суток после окончания его применения.

19. Особенностей действия при первом применении лекарственного препарата и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропускеочереднойдозыпрепарата курс применения необходимовозобновить как можно скорее в предусмотренной дозе и схеме применения.

21. Убой птицы на мясо и использование продукции в пищевых целях разрешается через 5 суток после последнего применения препарата Эймицид®. Мясо птицы, вынужденно убитой до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д.1
Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д.1

Начальник ОРиС Васильченко Д.И.