СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

03 ИЮН 2024

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Мадефорд®

(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов, ул им. Осипова В.И., д. 1)

Номер регистрационного удостоверения 44-3-3.21-4736№ПВР-3-3.21/03620

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

- торговое наименование лекарственного препарата: Мадефорд® (Madeford);
- международное непатентованное наименование: мадурамицин.

2. Лекарственная форма: гранулы для орального применения.

Мадефорд® в 1 г в качестве действующего вещества содержит мадурамицин аммония - 10 мг, а также вспомогательные вещества: макрогол цетостеариловый эфир, сахар и мел.

3. Лекарственный препарат по внешнему виду представляет собой гранулы от светло-серого до серо-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 3 месяца. Запрещается применять Мадефорд® по истечении срока годности.

4. Мадефорд® выпускают расфасованным по 500 г и 1 кг в пакеты из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги; по 5 кг в пакеты из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги или в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым внутренним слоем; по 20 кг в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым внутренним слоем. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от влаги и от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности не более 65 %.

6. Мадефорд® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат Мадефорд® утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Мадефорд® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мадефорд® относится к фармакотерапевтической группе - антикокцидийные средства.

10. Мадурамицин аммония, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении всех видов кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц, в том числе *Eimeria necatrix, Eimeria tenella, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria mivati, Eimeria acervulina, Eimeria praecox, Eimeria mitis* на стадиях спорогонии, трофозоита и ранних стадий шизогонии.

Механизм действия мадурамицина заключается в избирательном усилении транспорта одновалентных катионов (ионов натрия и калия) через мембрану клетки, что приводит к усилению поступления воды внутрь клетки, нарушению клеточного тургора, набуханию цитоплазмы и последующей гибели кокцидий из-за разрыва клеточной мембраны.

При пероральном применении мадурамицин аммония практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и проявляет свое антикокцидийное действие в слизистой оболочке и в подслизистом слое кишечника. Выводится из организма птицы в неизмененном виде преимущественно с пометом в течение 2-3 дней.

Мадефорд® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Мадефорд® назначают цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур с целью профилактики кокцидиоза.

12. Запрещается применение препарата Мадефорд® племенной птице, курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки, в связи с его накоплением в яйцах; а также животным других видов.

13. При работе с лекарственным препаратом Мадефорд® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Мадефорд®. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Мадефорд® не предназначен для применения млекопитающим.

15. Мадефорд® применяют птице в смеси с кормом в дозе 500 г на 1 тонну корма (в пересчете на действующее вещество – 5 мг мадурамицина на 1 кг корма):

- цыплятам-бройлерам – с первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убоя;
- ремонтному молодняку кур – с первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

Не допускать превышения рекомендуемой дозы препарата.

Для обеспечения равномерного распределения препарата в корме используют ступенчатое смешивание. Рассчитанную дозу препарата Мадефорд® смешивают с небольшим количеством комбикорма (5-10% от общего объёма корма) и затем, при тщательном перемешивании, вносят в конечный объём корма.

При использовании препарата необходимо обеспечить бесперебойное потребление воды птицей.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у птиц, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке у птиц может наблюдаться угнетение, снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. Не допускается применение препарата Мадефорд® одновременно с другими антикокцидийными средствами, совместно с тиамулином, а также за 7 дней до начала и 7 дней после окончания его применения.

19. Особенностей действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не установлено.

20. В случае пропуска очередной дозы, применение возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой птиц на мясо разрешается не ранее чем через 5 суток после последнего применения препарата Мадефорд®. Мясо птиц, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д.1.
Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на приятие претензий от потребителя.	ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д.1.

Начальник ОРиС Васильченко Д.И.