СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К.А. САВЕНКОВ
08 АПР 2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Амбигранум®-С
(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов,
ул. им. Осипова В.И., д. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-07.25-5312-ПВР-3-07.25/04073

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

– торговое наименование лекарственного препарата – Амбигранум®-С (Ambigranum-S).

– международное непатентованное наименование – салиномицин, никарбазин.

2. Лекарственная форма – гранулы для приема внутрь.

Амбигранум®-С в качестве действующих веществ в 1 г содержит 80 мг салиномицина и 80 мг никарбазина, а также вспомогательные вещества: манную крупу и мел.

3. Амбигранум®-С по внешнему виду представляет собой гранулы от светлого серо-желтого до зелено-коричневого цвета, допускаются более темные включения.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки – 4 месяца. Запрещается применять Амбигранум®-С по истечении срока годности.

4. Амбигранум®-С выпускают расфасованным по 500 г, 1 кг в пакеты из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги; по 5 кг в пакеты из материала комбинированного на основе алюминиевой фольги или в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым внутренним слоем; по 20 кг, 25 кг в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым внутренним слоем. Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от влаги и от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности не более 65%.

6. Амбигранум®-С следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат Амбигранум®-С утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту на лекарственный препарат или требованию ветеринарной организации.

II. Фармакологические свойства

9. Амбигранум®-С относится к антикокцидийным лекарственным препаратам.

10. Антикокцидийное действие лекарственного препарата обусловлено синергизмом входящих в его состав активных компонентов — салиномицина (ионофорный антибиотик) и никарбазина (производное динитрокарбанилида). Салиномицин представляет собой продукт ферментации гриба Streptomyces albus. Механизм действия салиномицина связан с нарушением переноса катионов натрия и калия у неполовозрелых форм кокцидий, что приводит к их гибели на стадии шизогонии.

Никарбазин – синтетический противококцидийный препарат, представляющий собой комплекс компонентов: 4,4'-динитродифенилмочевины (DNC) и 2-гидро-4,6-диметилпиримидина (HDP). Механизм антикокцидийного действия никарбазина заключается в ингибировании энергетического метаболизма в организме паразита. Он прерывает жизненный цикл кокцидий на разных стадиях развития, наиболее активен на стадии шизонтов второго поколения.

Совместное действие входящих в состав препарата компонентов не только увеличивает антикокцидийную активность препарата, но и замедляет развитие резистентности.

Препарат обладает широким спектром антикокцидийного действия, активен в отношении: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. mivati, E. necatrix, E. praecox, E. tenella и других видов кокцидий, паразитирующих у птиц.

После перорального применения Амбигранум®-С практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает антикокцидийное действие в слизистой оболочке и подслизистом слое кишечника. Выводится из организма преимущественно в неизмененном виде с пометом.

Амбигранум®-С по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Амбигранум®-С назначают цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур с целью профилактики кокцидиоза.

12. Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки, ввиду его накопления в яйцах.

13. При работе с препаратом Амбигранум®-С следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Амбигранум®-С. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат не предназначен для применения млекопитающим.

15. Амбигранум®-С применяют в смеси с кормом в дозе 500-625 г на 1 тонну корма (эквивалентно 40-50 г салиномицина и 40-50 г никарбазина на 1 тонну корма):

– цыплятам-бройлерам – с первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 суток до убоя;

– ремонтному молодняку кур – с первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

Для обеспечения равномерного распределения препарата в корме используют ступенчатое смешивание. Рассчитанную дозу препарата Амбигранум®-С смешивают с небольшим количеством корма (5-10% от общего объема) и затем, при тщательном перемешивании, вносят в конечный объем корма.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке лекарственного препарата у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы. При признаках интоксикации применение препарата прекращают, применяют средства симптоматической терапии.

18. Запрещается применение препарата в течение 7 суток до и в течение 7 суток после применения тиамулина, а также с другими кокцидиостатиками. Лекарственный препарат совместим с витаминными и кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве.

19. Особенностей действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме. Не допускается превышение рекомендуемой дозы препарата для компенсации пропущенной.

21. Убой птиц на мясо разрешается не ранее чем через 5 суток после окончания применения препарата. Мясо птицы, вынужденно убитой до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов, ул.им. Осипова В. И., д. 1.
Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В. И., д. 1.

Начальник ОРиС Васильченко Д. И.